



برگه اطلاعات دارویی

کلوبیدوگرل - CLOPIDOGREL

معرف دارو

کلوبیدوگرل متعلق به دسته داروهای معروف به "مهار کننده های ADP" هست که عملکرد آن در بدنه موجب مهار پلاکت های خون می شود. این دارو پلاکت های خون را به صورت دائمی بلوک کرده و عملکرد آنها را از بین می برد. مهار پلاکت ها باعث کاهش قدرت لخته شدن خون می شود. این دارو برای کاهش خطر لخته شدن خون بعد از حمله قلبی، سکته مغزی و بدخی از بیماریهای عروق بکار می رود.

نکات لازم در مصرف دارو

این دارو به صورت قرص های ۷۵ میلی گرم در دسترس است. **پلاویکس، زیلت، اسویکس و کلوبیدوگرل** نامهای تجاری این دارو است که در دسترس هستند. کلوبیدوگرل معمولاً یک بار در روز مصرف می شود ولی احتمال دارد در موارد خاص دو بار در روز یا یک روز در میان هم تجویز شود. هیچ گونه ترجیح زمانی خاصی برای مصرف کلوبیدوگرل وجود ندارد و در هر ساعتی از شبازو، با معده خالی یا پر می توان این دارو را مصرف نمود.

- با توجه به اینکه این دارو با نام های تجاری و برجسب های متفاوت بوسیله چندین شرکت دارویی تولید می شود، لازم است در زمان مصرف به نام اصلی دارو توجه کرد تا از مصرف همزمان چند قرص با هم و مسمومیت دارویی، جلوگیری کرد.

- در صورت فراموشی دارو لازم است در اولین فرصت در همان روز مصرف شود. اگر کمتر از ۶ ساعت تا مصرف دوز بعدی دارو باقی مانده بود، از مصرف دارو صرف نظر کرده و دوز بعدی را سر ساعت مصرف نمایید. از خودن دو دوز از دارو با هم یا در کمتر از ۶ ساعت فاصله از یکدیگر پرهیز کنید.

- مسمومیت با این دارو می تواند منجر به خونریزی بیوژه خونریزی گوارشی شود. در صورت مصرف بیش از میزان توصیه شده لازم است به اورژانس مراجعه نمایید.

- این دارو معمولاً به همراه آسپیرین مصرف می شود. بهتر است بین زمان مصرف این دو دارو ۱۲ ساعت فاصله باشد.

- اثرات دارو بر جنبین یا کودک شیرخوار مشخص نیست، با اینحال در موارد لازم این دارو در دوران بارداری یا شیردهی قابل استفاده است.

- وزشکاران حرفه ای و افراد با فعالیت بدن سنگین و افراد در معرض ضربه های بدنی، لازم است در مورد نحوه مصرف دارو با پزشک خود مشورت نمایند.

این دارو معمولاً به همراه آسپیرین مصرف می شود و در کنار آن برای مدت محدودی تجویز می شود. افراد زیر لازم است از یک ماه تا چند سال بسته به نظر پزشک از کلوبیدوگرل در کنار آسپیرین استفاده نمایند:

- افرادی که حمله قلبی داشته اند و دچار سندرمهای حاد قلبی مانند سکته قلبی یا آنژین ناپایدار شده اند.

- افرادی که سکته مغزی کرده اند، یا حمله گذرای ایسکم مغزی TIA داشته اند.

- افرادی که به هر شکل استثنی دارو خونریزی از دندان استثنی عروق کرونر، استثنی عروق محیط بدن، استثنی کاروتید یا داخل مغز دارند.

- افراد با دریچه های مصنوعی قلبی یا بعد از ترمیم تقایص مادرزادی داخل قلبی.

- بعد از جراحی های قلبی مانند جراحی بای پس عروق قلبی یا ترمیم بیماریهای ساختاری قلب.

- در بخش از افراد که حساسیت به آسپیرین دارند و نمی توانند از آن استفاده نمایند، این دارو به عنوان جایگزین آسپیرین مورد استفاده قرار می گیرد.

موارد مصرف دارو

همترین عارضه این دارو **خونریزی** است. خونریزی می تواند از موارد خفیف مانند خونریزی از دندان در زمان مساوک زدن تا موارد متوسط مانند خونریزی زیر پوست و خونریزی از ادار تا موارد شدیدی همچون خونریزی مغزی یا خونریزی از معده و روده متغیر باشد.

عوارض شایع (تا ۱۰ درصد موارد): عفونت تنفسی، درد سینه، سردرد، علایم شبیه به سرماخوردگی، درد مفاصل، احساس سرگیجه، اسهال، ضایعات پوستی، آبریزش بینی، افسردگی و عفونت ادراری.

لازم است در هر مراجعته به پزشک مصرف این دارو و البته سایر داروهای غیر قلبی به تداخل دارویی توجه داشته باشند.

افرادی که کلوبیدوگرل مصرف می کنند، باید این داروها را استفاده نمایند:
تیکاگرولول، پراسوگول.

تداخل دارویی

این داروها با احتیاط و تحت نظر پزشک مصرف شوند:

ریواروکسابان، آپیکسابان، دایکاتران، وارفارین، کاریامازین، سایمیدین، کلاریترومایسین، اریترومایسین، امپرازل، فلوكستین، فلوكونازول، فلوكسامین، رپاگلینید، ایوبیروفن، دیکلوفناک، پردنیزولون و داروهای ضد قارچ مانند کتونازول.

تداخل غذایی

این دارو تداخلات غذایی خاصی ندارد.

صرف کل بیش از حد هم زمان با این دارو می تواند عوارض خونریزی دارو را افزایش دهد.

تداخل با بیماریها

افرادی که بیماری کبدی دارند باید در شروع دارو و در ادامه مصرف حتماً تحت نظر پزشک باشند. با توجه به اینکه متابلیسم این دارو از طریق کبد صورت می گیرد، نارسایی کبدی می تواند بر روی اثربخشی دارو تأثیر گذار باشد.
اگر شما بیماری خونریزی دهنده مانند کمبود پلاکت خون، هموفیل و اختلالات انعقادی خون دارید، لازم است به پزشک خود اطلاع دهید.

نکات مهم در مصرف دارو

قطع خودسرانه این دارو بسیار خطربنگ است و حتماً باید از آن پرهیز نمایید. تغییر دوز یا قطع این دارو حتماً باید زیر نظر پزشک باشد.
انجام بسیاری از **عمل های جراحی** به دلیل خونریزی با این دارو ممکن نیست. لازم است صرفاً برای عمل های ضروری و البته با نظر پزشک معالج برای مدت کمی مصرف دارو قطع شده و بعد از عمل مجدد از سر گرفته شود.